

COMPARATIVA TIPOS DE TCA

	ANOREXIA	BULIMIA	TRASTORNO POR ATRACÓN
Origen ¿Cuándo aparece?	Entre los 12 - 17 años (actualmente bajando)	Entre los 14 - 18 años (típicamente más tardía que la AN)	Sobre los 20 años o final de adolescencia
IMC	Infrapeso (inferior a las recomendaciones de salud)	Normopeso (Normal a las recomendaciones de salud o ligeramente por arriba)	Sobrepeso (En exceso a las recomendaciones de salud o ligeramente por arriba)
Dieta estricta	Sí	No	No
Ingestas impulsivas	No (a excepción de algunas A.N purgativas)	Sí	Sí
Conductas compensatorias (laxantes, diuréticos, ejercicio excesivo, etc.)	Sí	Sí	No

COMPARATIVA TIPOS DE TCA

	ANOREXIA	BULÍMIA	TRASTORNO POR ATRACON
Complicaciones médicas	Sí. A corto y largo plazo Alta severidad	Sí. A corto y largo plazo Alta severidad	No a corto plazo pero puede que a largo plazo sí
Nivel de consciencia del problema	No o de forma muy sutil	Sí	Mayormente sí pero a veces no
Ocultación del problema	Sí (pero repercute en el físico rápidamente)	Sí	Sí